

Liste Illustrée des Oiseaux de Djbel Sidi Amor (2006 - 2017)





Cet inventaire inclut toutes les espèces observées (**160** au total) sur le site de Djbel Sidi Amor, pendant **671** jours d'observation entre le **12 avril 2006** et le **29 avril 2017**.

« Le site » comprend le jardin botanique, ainsi que les champs, les herbages, la garrigue, la forêt et les bords de la falaise avoisinante (environ 150 ha).

Il s'agit d'oiseaux sédentaires, **nicheurs** (**32** espèces) ou **hivernants** (**20** espèces), aussi bien que d'oiseaux de passage comme les **migrateurs** (**54** espèces) et les espèces qui ne survolent le site qu'occasionnellement.

La présence a été recensée par décade (1^{ier} au 10^{ième} ; 11^{ième} au 20^{ième} ; 21^{ième} au 31^{ième})

- ✓ cellule bleu foncé : l'espèce a été observée plus ou moins régulièrement (minimum trois fois)
- ✓ cellule bleu claire : l'espèce n'a pas été observée, mais la présence est (très) probable
- ✓ cellule avec x : l'espèce n'a été observée qu'une fois (**x rouge** : date ou espèce exceptionnelle)
- ✓ cellule vide dans une décade avec des jours d'observation : l'espèce est peut-être présente, mais elle n'a pas été observée
- ✓ cellule vide dans une décade sans jours d'observation : la présence locale reste à être prouvée
- ✓ cellule bleu foncé dans une décade sans jours d'observation : l'espèce n'a évidemment pas été observée, mais la présence est certaine
- ✓ cellule avec chiffre **bleu** : date de la première observation de l'oiseaux migrateur
- ✓ cellule avec chiffre **vert** : date de la dernière observation de l'oiseaux migrateur

→ Espèce en **gras** : oiseaux nicheur

→ Espèce en *italique* : uniquement en survol

Les couleurs des noms précisent le **statut local** de l'espèce (dans les périodes de présence) :

Abondante **Commune ou Fréquente** **ni Rare/ni Commune** **Rare ou peu Fréquente** **Exceptionnelle**

	Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Aout			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre					
Nombre de jours d'observation	7	10	4	8	3	3	2	23	30	50	66	73	52	38	22	15	6	15	14	16	6	00	00	3	19	11	17	18	23	25	18	20	15	14	22	2			
Nombre d'espèces par mois	50			45			87			126			98			55			50			41			75			84			60			52					
Nombre d'espèces par décade	42	35	37	42	34	27	15	66	79	91	100	101	88	77	62	51	36	46	39	39	34		41		63	54	53	57	64	62	48	46	38	44	48	17			
1. Grand cormoran		x																											xx	x					x				
2. Bihoreau gris												x					x	x									x												
3. Héron garde-bœufs																								x															
4. Aigrette garzette								x				x	xx				x	x					x						x										
5. Grande aigrette																	x																						
6. Héron cendré									xx	x		x				x										x	x												
7. Cigogne blanche																x										x													
8. Cigogne noire							17	xx	x				8			x									x	x													
9. Ibis falcinelle													x																										
10. Flamant rose								x																			x	x		x									

[illegible]

63. Tourterelle turque							xx										xx	x		x				
64. Tourterelle des bois							31											18						
65. Tourterelle maillée																								
66. Coucou gris							12						25											
67. Coucou gai									11															
68. Effraie des clochers							x	x		?	x	xx				x								
69. Grand-duc du désert								x										x		?			xx	x
70. Chevêche d'Athéna																								
71. Chouette hulotte	x				?				?	x							x	x	?	?				
72. Hibou des marais	x									18												9		x
73. Engoulevent d'Europe										16								xx						
74. Engoulevent à collier roux									27	x						x								
75. Martinet noir				2			11													x	16			
76. Martinet pâle					x					xx	x	x		x		x			xx	x			19	
77. Martinet à ventre blanc							12															8		
78. Martinet des maisons	xx	xx		x				xx	x				x					x	x				x	
79. Martin pêcheur																								
80. Guêpier d'Europe								4													6			
81. Rollier d'Europe									17				x			x				14				
82. Huppe fasciée	x	xx	x	x																			x	17
83. Torcol fourmilier								5		x							x							
84. Alouette calandrelle											x													
85. Alouette pispette								25	xx	xx	x		x											
86. Cochevis huppé				x																				
87. Alouette des champs			x						10											3			17	
88. Hirondelle de rivage								28				xx		27						x	20			
89. Hirondelle de rochers								x																
90. Hirondelle rustique								11														27		
91. Hirondelle rousseline									8x	x	x	1								6				
92. Hirondelle de fenêtre			22	x	x									x	x									17
	Janvier	Février			Mars																			
93. Pipit de Richard						28																		
94. Pipit rousseline							10	x	23										?	2				
95. Pipit des arbres							28					14						3			19			
96. Pipit farlouse							xx		x													21		
97. Pipit à gorge rousse	x																						x	
98. Pipit spioncelle		xx					x	x	xx													23	xx	
99. Bergeronnette printanière							28		x	x	x						x				13			
100. Bergeronnette des ruisseaux				x																		14		
101. Bergeronnette grise					x			x	11													15		x
102. Bulbul des jardins											x	x		x										x
103. Troglodyte mignon			x											x				x	x					
104. Agrobate roux								6																
105. Rouge-gorge familier										21												6		
106. Rossignol philomèle							23					17												
107. Rouge-queue noir									17													17		
108. Rouge-queue à front blanc							19						24					6					23	
109. Tarier des prés									13				26						24		x	23		
110. Tarier pâtre							19															20		
111. Traquet isabelle									x															
112. Traquet motteux							23				9							2		30				
113. Traquet oreillard							30				x		x						1					
114. Monticole de roche								16																
115. Merle bleu				x				27													7		x	

[illegible]

47 espèces plus ou moins courantes, photographiées sur le site



L'énigmatique **Oedichne cryard** *Burhinus oedichnemus* est souvent présent sur les terres non cultivées au début du printemps.



Présent toute l'année, deux couples de **Chevêche d'Athéna** *Athene noctua* ont leur territoire autour du jardin









Chasseurs de nuit, le **Hibou de marais** *Asio flammeus* (en haut) et l'**Effraie des clochers** *Tyto alba* se cachent pendant la journée dans les arbres.





Le **Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis* visite parfois le jardin pour y chasser des grenouilles.





La **Bondrée apivore** *Pernis apivorus*, un rapace qui hiverne en Afrique équatoriale, est uniquement observée aux deux passages migratoires. Dès la fin d'avril et en mai, ils passent en groupes se dirigeant vers Cap Bon, où un grand nombre d'entre eux se rassemblent pour effectuer la traversée la plus courte vers le continent européen.





Les **Faucons crécerelle** *Falco tinnunculus* (femelle à gauche, mâle à droite) ne sont jamais absents du ciel.



Le **Faucon crécerellette** *Falco naumanni* (couple et mâle) est une espèce vulnérable au niveau mondial. Elle niche par quelques couples dans des conditions précaires sur les falaises de la carrière.



Le **Circaète Jean-le-blanc** *Circaetus gallicus*, aigle impressionnant, survole le site régulièrement, des fois à faible hauteur.



L'Elanion blanc *Elanus caeruleus* est un petit rapace élégant dont l'aire de répartition s'accroît en Afrique du nord. En Tunisie il n'en vit pas beaucoup plus qu'une trentaine de couples, dans le nord du pays. Ici il est fréquemment observé.









Le Faucon pèlerin *Falco peregrinus brookei* (adulte) en action.



Un jeune **Faucon pèlerin** *Falco peregrinus brookei* quelques jours après avoir quitté le nid. Je suis visiblement le premier bipède qu'il rencontre.



La **Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* (en haut) rejoint la plus commune **Tourterelle maillée** *Streptopelia senegalensis* sédentaire d'avril à septembre.





L'**Etourneau unicolore** *Sturnus unicolor* est omniprésent : un oiseau dont le riche vocabulaire n'échappe à personne !









La **Huppe fasciée** *Upupa epops*, oiseau sacré du Coran, est présente pendant toute l'année, mais rare en hiver. En été, très tôt le matin, il se forme des rassemblements de 20 à 30 oiseaux dans un arbre près de la maison.











La Bergeronnette grise *Motacilla alba*



Le **Grand corbeau** *Corvus corax* peut être observé toute l'année, survolant fréquemment le site en couple.



Le **Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus* est un oiseau tropical, principalement de passage entre fin avril et début mai.



Le Gobemouche à collier (mâle blessé)



L'Hypolaïs ictérine



Le Cisticole des joncs



Le Bruant proyer



Le Tarier des prés (mâle)



L'Hirondelle rustique

La Pie-grièche à tête rousse





Mâle



Femelle







Le Traquet oreillard *Oenanthe hispanica hispanica* (mâle)



Le Gobemouche gris *Muscicapa striata*





Le **Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca* est un oiseau migrateur, abondant en printemps, extrêmement rare en automne. Voici le mâle.





Le Merle noir *Turdus merula*





Ce **Cochevis huppé** *Galerida cristata* a construit son nid sous les délicates *Ebenus pinnatus*.







La **Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala*, espèce caractéristique de la garrigue, se montre rarement, vivant cachée dans la végétation.







L'Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* est un maître du camouflage. Voici une prise rare.



La **Pie-grièche méridionale** *Lanius meridionalis* est un des oiseaux caractéristiques du site, présente toute l'année par plusieurs couples. Perchée sur un arbuste, elle surveille continuellement les environs, à la recherche de grands insectes.









Le **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* arrive au mois d'avril pour nicher par quelques couples dans le oued, où il creuse son nid.
 Dans cette période et en automne, de nombreux migrants - jusqu'à 200 oiseaux – s'y rassemblent le soir pour dormir.









La période de reproduction du **Bec-croisé des sapins** *Loxia curvirostra* est liée à celle de la maturation des graines de cônes dont l'oiseau se nourrit à l'aide de son bec spécifique. La présence de jeunes oiseaux (photo) au début du printemps près de l'abreuvoir prouve qu'ils nichent dans les forêts avoisinantes.





Le Martinet à ventre blanc



La Mésange maghrébine



Le Moineau espagnol (mâle)



Le Pinson des arbres africain (mâle)



Le Pouillot siffleur



Le Serin cini (mâle + femelle)



Le Rouge-gorge



Le Rouge-queue à front blanc (mâle)



Le Rouge-queue noir (femelle)





L'**Etourneau sansonnet** *Sturnus vulgaris* est un hivernant d'octobre à février.



Le **Verdier d'Europe** *Carduelis chloris*, nicheur sédentaire, devient abondant en automne, lorsque les hivernants européens arrivent.

Mise à jour le 15 mai 2017



© 2017 – GDA Sidi Amor

Toutes les photos, sans exception, sont prises sur le site. Ce document a été réalisé par Le Groupement de Développement Agricole Sidi Amor. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite du GDA.